

품 목	오큐호마핀 점안액 설명서		
전체규격	106 × 176 (mm)		
도 수	1도	■ K	
폰트규격	8 (point)		
변경사항	① 전성분 표시 ② 삼일 CI 및 본사 주소 삭제 ③ 효능효과 주의문구 삭제 ④ 판매원 변경에 따른 변경 (판매원 : 한국엘러간 → 삼일제약) ⑤ 소비자상담전화, 홈페이지 변경		

파마코드 : 20번



※ 의약품을 사용하기 전 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

전문의약품

오큐호마핀[®] 점안액
(호마트로핀브롬화수소산염)

HM00501-2017-1

의 약 품	1 3 1
분류번호	안과용제

오큐호마핀[®] 점안액은 모양근마비 및 산동(동공확대)작용을 갖는 국소용 항콜린제로서, 아트로핀에 비하여 산동(동공확대)작용의 발현(드러냄)이 신속하여 안과영역에서 각종 진단 및 치료를 위한 산동(동공확대) 및 조절마비에 효과적인 약물입니다.

【원료약품의 분량】 1mL 중
유효성분 : 호마트로핀브롬화수소산염(KP) 20mg
첨가제(보존제) : 벤질코늄염화물액10%(KP) 1mg
(벤질코늄염화물로서 0.1mg)
첨가제 : 염산, 염화나트륨, 주사용수, 폴리소르베이트80, 히프로멜로오스2910

【성 상】 무색 투명한 수용성 점안액

【효능·효과】 진단 또는 치료를 목적으로 하는 산동(동공확대) 및 조절마비

【용법·용량】 1일 1~2방울 1회 점안(눈에 넣음)한다. 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
- 1) 원발성 녹내장, 폐쇄각 등의 녹내장 및 안압상승 소인이 있는 환자
 - 2) 이 약의 성분 및 아트로핀에 과민증 환자
 - 3) 중증(심한증상) 근무력증(근육무력증) 환자
 - 4) 심부전으로 인한 이차성 빈맥(빠른맥) 환자
 - 5) 갑상선 기능항진증 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
- 1) 원추각막 환자
 - 2) 다운증후군 환자
 - 3) 뇌손상이 있는 소아
 - 4) 고령자(노인)
 - 5) 영·유아 및 소아
 - 6) 열이 있는 환자 또는 상승된 온도의 환경에 노출될 가능성이 있는 환자
3. 이상반응
- 1) 정신 신경계 : 드물게 환각, 어지러움 등이 나타날 수 있다.
 - 2) 소화기계 : 구역, 구토, 구갈(목마름) 등이 나타날 수 있다.
 - 3) 순환기계 : 혈압상승, 심계항진(두근거림), 혈관울혈 등이 나타날 수 있다.
 - 4) 눈 : 일시적인 자통(찌르는 것 같은 아픔)과 작열감(화끈감)이 나타날 수 있으며 장기사용시 낭포성 결막염, 눈의 자극감, 결막 충혈, 빛에 대한 감수성의 증가가 나타날 수 있다.
 - 5) 기타 : 안면(얼굴)홍조, 부종(부기), 삼출, 습진성 피부염이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
- 1) 동공이 확대되어 있는 동안 운전 또는 위험한 작업에 종사하지 않도록 주의한다.
 - 2) 환자는 광과민성을 경험할 수 있으며, 산동(동공확대) 시 밝은 조명에서는 눈을 보호하여야 한다.
 - 3) 보호자는 이 약이 소아의 입에 닿지 않도록 주의하여야 하며, 점안(눈에 넣음) 후에는 보호자와 소아의 손을 반드시 씻어야 한다.



HM00501-2017-1

- 4) 과도한 전신흡수를 방지하기 위해 점안(눈에 넣음) 후 2~3분간 누낭(눈물 주머니)부를 손끝으로 누른다.
- 5) 폐쇄각 녹내장 유발을 방지하기 위해서 전방각의 심도를 측정한다.

5. 상호작용

삼환계 항우울약, 페노티아진계 약물, 항히스타민제와 병용(함께 사용)할 경우 이 약의 작용이 증강될 수 있으므로 주의한다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임부에 투여 시 태아독성이나 생식력에 미치는 영향에 대해서는 알려지지 않았으므로 반드시 필요한 경우에만 투여한다.
- 2) 이 약의 유즙(젖)으로의 이행여부는 밝혀지지 않았으나 많은 약들이 모유로 배출되므로 수유부에 투여시 특히 주의한다.

7. 소아에 대한 투여

유·소아에 투여할 경우 특히 주의한다.

8. 과량 투여시의 처치

이 약의 과도한 과소투여는 헛소리, 초조, 드물게 혼수에까지 이르는 정신착란상태를 초래할 수도 있다. 소아 및 고령자(노인)에게 이러한 전신흡수 이상반응의 가능성이 크며 살리실산 피소스티그민이 이런 전신적 항콜린 증후군에 대한 해독제이다.

9. 적응상의 주의

- 1) 반드시 안과용으로만 사용되어야 하며, 주사제로 사용되어서는 안된다.
- 2) 점안(눈에 넣음) 시 용기의 입구가 직접 눈에 닿지 않도록 주의한다.
- 3) 오염을 방지하기 위해 될 수 있는 한 공동으로 사용하지 않는다.

10. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록(습기가 적은) 서늘한 곳에(밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아)) 보관한다.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【포장단위】 5mL(병)

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 3년

- ※ 점안(눈에 넣음)시 용기의 끝이 눈에 닿지 않도록 최소 5mm이상 떨어진 위치에서 점적하시기 바랍니다.
- ※ 사용기한이 경과한 제품은 사용하지 마시기 바랍니다.
- ※ 다른 사람들과 함께 사용하지 마십시오.
- ※ 환기가 잘 되는 청결한 장소에 보관하십시오.
- ※ 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말고, 뚜껑을 꼭 닫아서 보관하십시오.

* 이 첨부문서 작성(개정)년월 이후 변경된 내용은 다음에서 확인하실 수 있습니다.

♣ 소비자상담전화 : 080-520-3131

♣ 홈페이지 : www.samil-pharm.com 또는 온라인 의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)

「변질·변패 되었거나 사용기한이 경과한 제품을 구입하셨을 경우에는 구입처를 통하여 직접 교환하여 드립니다.」

첨부문서 작성(개정)년월 : 2017년 8월

제조판매원 **삼일제약** 주

경기도 안산시 단원구 산단로 216, 반월공업단지 비 11-6