

* 의약품 사용 전 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

일반의약품

1세이상 소아부터

엄마손[®]

시럽

MS10001-2021-1

[원료약품의 분량] 100mL 중

유효성분:

감초엑스(KP)	1000mg
아산화20%에탄올추출액(1→2.5)(별규)	8.5mL
용담에탄올추출액(1→0.88)(별규)	0.8mL
육계70%에탄올티크(1→5)(별규)	3.5mL
인삼유동엑스(생규)	0.3mL
황금연조엑스(2.5→1)(별규)	120mg
황련·황백50%에탄올추출액(1→2.5)(별규)	5.8mL

첨가제(보존제):

파라옥시벤조산메틸(KP)	50mg
파라옥시벤조산프로필(KP)	50mg

첨가제: 글리세린, 박하유, 베타덱스, 수크랄로스, 시트르산수화물, 자일리톨, 잔탄검, 정제수, 폴리인산나트륨

[성 상] 플라스틱병에 담긴 특이한 맛과 냄새를 지닌 담황갈색의 현탁시럽제

[효능·효과] 식욕감퇴(식욕부진), 위부팽만감, 소화불량, 과식, 체합, 구역, 구토, 정장, 변비, 묽은 변, 복부(배부분)팽만감, 장내이상발효

[용법·용량] 소아용량

나 이	1회 복용량
1~2세	2.0mL
3~4세	2.5mL
5~7세	3.5mL
8~10세	5.0mL
11~14세	6.5mL

성인 및 15세 이상: 1회 10mL
1일 3회 식후에 복용한다. 복용간격은 4시간 이상으로 한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

만 3개월 미만의 영아(갓난아기)에게 복용시키지 말 것. 또 만 3개월 이상이라도 만 1세 미만의 영아(갓난아기)는 의사의 진료를 받는 것을 우선으로 하며, 부득이한 경우를 제외하고 복용시키지 말 것

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 고혈압 환자, 고령자(노인), 심장장애 또는 신장장애(신장(콩팥)장애) 환자, 부종(부기)환자
- 다른 약물을 복용하고 있는 사람: 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메티아지드)와 병용(함께 복용)시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것
- 의사의 치료를 받고 있는 환자

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부문서를 소지할 것

- 위알도스테론증: 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등(1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것
- 근병증(근육병증): 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우
- 수일간 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
- 2) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것
- 3) 장기간 계속하여 복용하지 말 것

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것
- 3) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것

[취급상의 주의사항]

엄마손시럽은 어린이들이 쉽게 개봉하기 어려운 어린이 보호용 마개(CRC=Child-Resistant Closure)를 사용하고 있습니다.

[사용법]

- ① 뚜껑을 누른 상태에서
- ② 시계반대방향으로 돌려주세요.



[포장단위] 100mL(병)

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

[사용기간] 제조일로부터 36개월

- * 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- * 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마시기 바랍니다.
- * 제품 취급시 포장재(용기, 케이스, 계량투약기)에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의 하시기 바랍니다.
- * 제품 사용 중 이물질이 혼입되지 않도록 주의해 주시기 바랍니다.
- * 사용 후 용기 입구를 깨끗히 닦고 용기마개를 너무 강하게 잠그지 마십시오.
- * 이 약은 생약성분을 배합한 제제로 간혹 침전이 생길 수 있으나 약효에는 변화가 없으니 안심하시기 바랍니다.

- * 이 첨부문서 작성(개정)일 이후 변경된 내용은 다음에서 확인하실 수 있습니다.
- 소비자상담전화 : 080-520-3131
- 홈페이지 : www.samil-pharm.com 또는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)
- 부작용보고 및 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

[변질·변패 되었거나 사용기한이 경과한 제품을 구입하셨을 경우에는 구입처를 통하여 직접 교환하여 드립니다.]

첨부문서 작성(개정)일 : 2021년 3월 19일

제조의뢰 및 판매자
삼일제약(주)
경기도 안산시 단원구 산단로 216 (원시동)

제조사:
1) 맥넬티제약(주)
충청남도 천안시 서북구 성환읍 울금3길 46
2) (주)녹십자
충청북도 음성군 금왕읍 무극로65번길 26