

※ 의약품을 사용하기 전 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

전문의약품

헤르페시드 안연고
(아시클로버)

HP00001-2017-1

의약품	131
분류번호	안과용제

헤르페시드 안연고는 단순헤르페스 바이러스(단순포진(물집) 바이러스)에 의한 각막염의 치료에 유효한 아시클로버 3%를 함유한 안연고제입니다.

【원료약품의 분량】 1g 중

유효성분 : 아시클로버(USP) 30mg
첨가제 : 백색바셀린, 유동파라핀

【성상】 흰색 또는 연한 노란색의 안연고제

【작용】 단순 포진(물집)바이러스(Herpes simplex virus)의 DNA합성을 저해하여 HSV에 의한 각막염을 효과적으로 치료합니다.

【효능·효과】 단순 포진 바이러스에 의한 각막염

【용법·용량】 1일 5회, 약 4시간마다 매회 튜브로서 1cm정도 짜낸 양을 안구하부(결막낭 하부)에 투여한다.
万一 후에도 적어도 3일간 더 투여한다.
증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

 이 약에 과민증 환자

2. 이상반응

- 1) 투여직후 일시적인 가벼운 자극감이 나타날 수 있다.
- 2) 비만성 표재성(표면에 있는) 각막염이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이러한 증상 발현(드러냄)
시 필요 최소량을 사용하며 적절한 처치를 한다.
- 3) 때때로 결막염(낭포성, 알레르기성 등), 각막궤양, 결막 미란(짓무름), 안검염(눈꺼풀염), 일시적인 자극
등이 나타날 수 있고 이러한 증상 발현(드러냄) 시 투여를 중지한다.
- 4) 과민증 : 접촉피부염이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한
처치를 한다.

3. 일반적 주의

- 1) 7일간 투여 시 개선의 기미가 보이지 않거나 증상이 악화되면 다른 치료방법을 찾는다.
- 2) 투여 완료전에도 이상반응의 발현(드러냄)에 주의하고 되도록 장기투여를 피한다.
- 3) 치료중에는 콘택트렌즈의 착용을 피한다.

HP00001-2017-1

4. 일부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신 초·중기에 투여 시 기형발생위험 및 태아 독성은 없으나 임신 말기 재발성 포진(물집)에 장기 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다.
- 2) 이 약 1회 200mg 1일 5회 경구투여 시 모유내 농도가 혈장 중 농도의 0.6~4.1배에 달할 수 있다.
이 경우 모유내 함유량이 1일 체중 kg당 0.3mg으로서 포진(물집)에 걸린 신생아에 투여량인 1일 체중 kg당 30mg에 훨씬 못 미치나 수유부의 경우 주의한다.

5. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다.

6. 적용상의 주의

- 1) 점안(눈에 넣음)용으로만 사용한다.
- 2) 점안(눈에 넣음) 시 용기의 입구가 직접 눈에 닿지 않도록 주의한다.
- 3) 오염을 방지하기 위해 릴 수 있는 한 공동으로 사용하지 않는다.
- 4) 개봉후 1개월 이내에 사용한다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사일광을 피하고 되도록(습기가 적은) 서늘한 곳에(밀접하여(뚜껑을 꼭 닫아)) 보관한다.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【포장단위】 3.5g/Tube

【저장방법】 밀폐용기, 25°C 이하보관

【사용기간】 제조일로부터 3년



※ 사용법 : 아래 눈꺼풀 안쪽에 이 약 일정량을 넣은 후 눈을 깜박입니다.

사용시 용기의 끝이 눈에 닿지 않도록 주의하십시오.

※ 점안(눈에 넣음)시 용기의 끝이 눈에 닿지 않도록 최소 5mm이상 떨어진 위치에서 점적하시기 바랍니다.

※ 사용기한이 경과한 제품은 사용하지 마시기 바랍니다.

※ 다른 사람들과 함께 사용하지 마십시오.

* 이 첨부문서 작성(개정)년월 이후 변경된 내용은 다음에서 확인하실 수 있습니다.

♣ 소비자상담전화 : 02-3019-4500

♣ 온라인 의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)

「변질·변패 되었거나 사용기한이 경과한 제품을 구입하셨을 경우에는 구입처를 통하여 직접 교환하여 드립니다.」

첨부문서 작성(개정)년월 : 2017년 8월

제조원 삼일제약|주

경기도 안산시 단원구 산단로 216, 반월공업단지 비 11-6

판매원  **한국엘리간(주)**